



Lipenherpes (Herpes Simplex I)

ist ein Virus den man in sich trägt gelitten haben ist es notwendig einen schmerzahften Ausbruch nach der Pigmentierung vorzubeugen.

allgemeine Vorbeugung
HOMÄOPATIE 
“L-Lysin”

empfohlene Nahrungsergänzungsmittel

“SC LIP FORTIFY”

L-Lysin 1000mg / Vitamin C 320mg
erhältlich bei mir im Studio

“GSE Herpes 1”

L-Lysin 800mg
erhältlich in der Apotheke

(14 Tage vor der Behandlung - 14 Tage nach der Behandlung)

*ein Herpesausbruch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden!
Im Falle eines Ausbruchs wird dieser aber gering gehalten.

Bei **hohem Risiko** empfiehlt sich die Einnahme von
„ACICLOVIR DOROM 400mg“ 

empfohlene Medikation

7 Tage - Beginn der Einnahme 2 Tage vor der Behandlung

Tag 1: 1 Tablette (abends)

Tag 2 - 6: 5 x 1/2 Tablette (morgens, mittags,
frühnachmittags, abends, vor dem Zubettgehen)

Tag 7: 2 x 1/2 Tablette (morgens & abends)

Das Medikament kann vom Gemeindearzt verschrieben werden.