



Herpes labiale (Herpes Simplex I)

È un virus che rimane latente nell'organismo; chi ne ha sofferto in passato deve prevenire una possibile ricomparsa dolorosa dopo la pigmentazione.

Prevenzione generale
OMEOPATIA 🌿
“L-Lisina”

Integratore alimentare consigliato:

“SC LIP FORTIFY”

L-Lisina 1000 mg / Vitamina C 320 mg
disponibile presso il mio studio

“GSE Herpes 1”

L-Lisina 800 mg
disponibile in farmacia

(Assumere per 14 giorni prima e 14 giorni dopo il trattamento)

*non è possibile escludere con certezza un'eruzione erpetica!
In caso di comparsa, tuttavia, sarà di lieve entità.

Per chi presenta un **rischio elevato**, si consiglia l'assunzione di
„**ACICLOVIR DOROM 400 mg**“ 💊

Terapia consigliata

Durata 7 giorni – iniziare 2 giorni prima del trattamento

Giorno 1-2: 2 compresse giornaliero (mattina e sera)

Giorni 3-5: 3 compresse giornaliero (mattina, mezzogiorno e sera)

Giorno 6-7: 2 compresse giornaliero (mattina e sera)

Il medicinale può essere **prescritto dal medico di base**.