



The Skin

Damit die Lippe bei der Pigmentierung in einem idealen Zustand ist und die Farbe gut aufnimmt ist es wichtig, dass die **Lippe vorab intensiv gepflegt** wird.

Sollte die Lippen trocken und schuppig sein muss diese gepeelt werden und, am besten über Nacht, mit einer **Lippenmaske** genährt werden.

Untertags regelmäßig einen **pflegenden Balsam** auftragen.

Weiters ist folgendes zu beachten:

- 48 Std. vor der Behandlung keine koffeinhaltigen Getränke sowie Alkohol
- keine blutverdünnenden Medikamente (Aspirin) etc.(im Falle ärztliche Absprache)



Herpes

Lipenherpes (Herpes Simplex I)

ist ein Virus den man in sich trägt. Sollte man je darunter gelitten haben ist es notwendig einen schmerzhaften Ausbruch nach der Pigmentierung vorzubeugen.

allgemeine Vorbeugung

HOMÄOPATIE

“L-Lysin”

empfohlenes Nahrungsergänzungsmittel

“GSE Herpes 1”

L-Lysin 800mg

erhältlich in der Apotheke

(14 Tage vor der Behandlung - 14 Tage nach der Behandlung)

*ein Herpesausbruch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Im Falle eines Ausbruchs wird dieser aber gering gehalten.

Bei **hohem Risiko** empfiehlt sich die Einnahme von

„ACICLOVIR DOROM 400mg“

Das Medikament kann vom Gemeindefacharzt verschrieben werden.

Genauere Medikation bitte mit dem Arzt besprechen.

unverbindliche übliche Medikation (zur Orientierung)

7 Tage - Beginn der Einnahme 2 Tage vor der Behandlung

Tag 1-2: 2 Tabletten täglich (morgens und abends)

Tag 3-5: 3 Tabletten täglich (morgens, mittags und abends)

Tag 6-7: 2 Tabletten täglich (morgens und abends)